

ОСТЕОПОРОЗ – БОЛЕЗНЬ ХРУПКИХ КОСТЕЙ: ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

Костная прочность снижена у каждого десятого, но не все вовремя узнают об этом

При остеопорозе возрастает риск возникновения перелома даже при небольшой нагрузке или ударе.

После перелома ослабленные кости восстанавливаются медленнее обычного.

В России остеопорозу подвержены не менее 10% жителей.

У каждой из трех женщин и у каждого из пяти мужчин после 50 лет есть нарушения костной прочности.

Дополнительные группы риска: женщины в период беременности и вскармливания, мужчины, регулярно употребляющие алкоголь, дети с заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта.

Развитие остеопороза можно не заметить, так как он часто развивается практически бессимптомно. При своевременном выявлении болезни ее развитие можно остановить проведением терапии, повышающей концентрацию кальция в костях, и мерами по оздоровлению образа жизни.

Своевременно проведенное исследование костной прочности может уберечь вас от больших неприятностей в будущем.

Ультразвуковое исследование прочности кости на **остеоденситометре MiniOmni (Израиль) – быстро, надежно и безопасно.**
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.

<http://medtextst.ru/>
medtextst@yandex.ru

127238, .
. (495) 902-59-26
(495) 518-55-99

. 85

